



DR. JOSÉ ARMANDO QUINTANILLA SILLER
MÉDICO INTERNISTA / ENDOCRINOLOGO
CP. 7113154 / CE. 11369892

Nombre : Luis Fernando Escamilla Miranda

UANL

Edad : 43

Fecha : 28/05/2024

1.- RYBELSUS 3mg (Semaglutida)

Tomar 1 tableta cada 24 horas, por las mañanas, siempre en ayunas, con 1 sorbo de agua, esperar para desayunar al menos 30 minutos

2.- RYBELSUS 7mg (Semaglutida)

Al finalizar caja de 3mg, comenzar a tomar 1 tableta cada 24 horas, por las mañanas, siempre en ayunas, con 1 sorbo de agua, esperar para desayunar al menos 30 minutos

3.- OZEPMIC 0.5mg (Semaglutida)

Aplicar 0.25mg Subcutáneo cada 7 días por 2 aplicaciones, posteriormente aplicar 0.5mg subcutáneos cada 7 días sin suspender

4.- PREDIAL PLUS comprimido de liberación prolongada 750 mg (Metformina)

Tomar 1 tableta cada 24 horas antes de la cena

5.- ATORVASTATINA comprimido 20 mg

Tomar 1 tableta cada 24 horas por las noches

NOTA: Usar rybelsus en caso de no conseguir ozempic

Dr. José Armando Quintanilla Siller

Urgencias: 818 010 4125

armandoqsiller@hotmail.com



Dr. José Armando Quintanilla Siller

Centro profesional DELTA, Consultorio 526, quinto piso, De la clínica #2520, Col. Sertoma, CP. 64710, Monterrey, Nuevo León